

1.- Generalidades

NATIVA CaBO es un nutriente esencial para las plantas, mejora la calidad de los frutos, dándole una mayor firmeza, textura, contenido, apariencia y vida pos-cosecha, este producto previene desordenes fisiológicos originados por deficiencia de Calcio Y Boro, como pudrición apical, manchas, grietas y apariencia corchosa de frutos, además de necrosis marginales, deformaciones foliares y manchas foliares, al darle firmeza a las paredes celulares de los plantas mejora considerablemente los daños provocados por enfermedades.

2.- Composición Porcentual

INGREDIENTES ACTIVOS	% en peso
Calcio(Ca)	12.00%
Boro (Bo)	2.50%
Diluyentes y acondicionadores	85.50%
Total	100.00%



3.- Tabla de dosis

Tiempo de reentrada a la zona tratada: 2 horas después de la aplicación. Intervalo de Seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

CULTIVO	DOSIS	Núm.. De aplicaciones y Época de APLICACION
Solanáceas Jitomate, Chile, Chile Bell, Berenjena, tomate de cascara, Papa, Tabaco, Cucurbitáceas, Melón, Sandia, Pepino, Calabaza, Calabacita, Chayote,	0.5 A 1.0 Litros por Hectárea	Aplicación al follaje y suelo durante todo el ciclo del cultivo
Fresas, Arándano, Frambuesa	0.5 A 1.0 Litros por Hectárea	Aplicación al follaje y suelo durante todo el ciclo del cultivo
Maíz, Trigo, Sorgo, Avena, Forrajes		
Frijol, Garbanzo frutales		

4.- Método de aplicación y preparación del producto

Calibre el equipo de aplicación antes de trabajar con el y agite el producto antes de usar.

Con el equipo de seguridad puesto quite la tapa e inviértala colóquela sobre el sello de seguridad y gírela sobre él para abrir con la cejilla de ayuda. Para medir la cantidad necesaria use un utensilio sólo para este fin, vierta en el tanque o equipo de aplicación con la mitad del volumen recomendado de agua, agite y complete el volumen necesario.

5. Contraindicaciones

Aplicar en condiciones climáticas favorables, no en horas de máxima insolación. No aplicar si se pronostica lluvias dentro de las 4 horas después de la aplicación. No aplicar con velocidad de viento superior a los 10 Km/hora. Preferentemente realizar la aplicación en las mañanas o por las tardes, a favor del viento, no es fitotóxico en los cultivos aquí indicados si se aplica de la forma correcta a la indicada en la etiqueta.

6. Compatibilidad No definida.

Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad. Aplicar el producto por la tarde para evitar horas de máxima irradiación solar. Es compatible con soluciones neutras y ligeramente básicas, No es fitotóxico en la dosis aquí recomendadas

7. Almacenamiento

condiciones de almacenaje y transporte: no almacene ni se transporte con ropa, alimentos y forrajes. hágalo en un lugar seguro, lejos de calor o fuego directo.

IMPORTANTE: la información aquí contenida no deberá tomarse como una garantía implícita o explícita, ni implica una responsabilidad legal, se ofrece únicamente para su consulta. Deberá leer la etiqueta antes de usar el producto.