

contiene una formulación única de extractos vegetales, es efectivo contra insectos de cuerpo blando y consistencia cerosa, al interferir en el metabolismo de la ecdisona y al mismo tiempo actúa en el sistema nervioso del insecto, afectando a adultos, lo que hace una mezcla sinérgica de alto desempeño con dos mecanismos de acción. Es un insecticida orgánico derivado de extractos vegetales, se puede aplicar en todos los cultivos de hortalizas, granos y frutales. De la misma forma controla otros transmisores o vectores de enfermedades virales. Primero, antes de usar el producto, calibre el equipo de aplicación, se recomienda utilizar un alto volumen de agua para una buena cobertura y de preferencia usar un coadyuvante de ultima generación para una buena dispersión y cobertura, para un mejor efecto del producto evita hacer aplicaciones a altas temperaturas o días con lluvia, evitar aplicar en sentido contrario a la dirección del viento o no aplicar si el viento no para.

2.- Composición Porcentual.	P/V
Extracto de Neem (Eq. a 20.70 g.i.a./L)	2.00%
Extracto de Canela (Eq. a 20.70 g.i.a./L)	2.00%
Extractos Mostaza (Eq. a 20.70 g.i.a./L)	2.00%
Extracto de Piretro (Eq. a 2.59 g.i.a./L)	0.25%
Extracto de Ajo (Eq. a 20.70 g.i.a./L)	2.00%
Diluyentes y conservadores	91.75%

Sinónimos: Sales potásicas de ácidos grasos de cadena corta

Hora de reentrada: 2 horas después de la aplicación

3.- Instrucciones de uso del producto.

Contiene una formulación sinérgica única. Es efectivo en los estados inmaduros de larvas, ninfas y pupas al interferir con el metabolismo de la ecdisona y al mismo en el sistema nervioso del insecto, afectando a adultos, lo que hace una mezcla sinérgica de alto desempeño con dos mecanismos de acción.

Es un insecticida orgánico derivado de extractos vegetales, se puede aplicar en todos los cultivos de hortalizas, granos y frutales. De la misma forma controla otros transmisores o vectores de enfermedades virales. Primero, antes de usar el producto calibre el equipo de aplicación, se recomienda utilizar un alto volumen de agua para una buena cobertura y de preferencia usar un coadyuvante de ultima generación para una buena dispersión y cobertura, para un mejor efecto del producto evita hacer aplicaciones a altas temperaturas o días con lluvia, evitar aplicar en sentido contrario a la dirección del viento o no aplicar si el viento no para.

4.- Incompatibilidad.

Es compatible con fertilizantes, fungicidas e insecticidas de uso común. Es compatible con soluciones acidas. No se mezcle con azufre ni cobre, se recomienda hacer pruebas previas cuando se desconozca la compatibilidad entre los productos a mezclar

5.- Fitotoxicidad.

Se puede aplicar a cualquier tipo de cultivo sin causar fitotoxicidad alguna siempre y cuando se utilice en las dosis recomendadas.

6.- condiciones de almacenamiento y transporte.

Almacene a temperatura ambiente en lugar ventilado y sombreado manténgase en su embase original bien cerrado y etiquetado, no existe restricciones de almacenamiento y transporte del producto.



RSCO-MEZC-INAC-0911G-X0085-009-8.25

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS
Chile Chile Bell Berenjena Papa	Paratrioza (<i>Bactericera Cockerelli</i>) Picudo Del Chile (<i>Anthonomus Eugeniei</i>) Mosca Blanca (<i>Bemisia Sp.</i>) Pulgón (<i>Aphididae Sp.</i>) Piojo Harinoso (<i>Planococcus Sp.</i>) Trips (<i>Frankliniella Sp.</i>) Minador De La Hoja (<i>Liriomyza Sp.</i>)	8 a 15 Mililitros
Pepino Calabaza Melón Sandia	Barrenador De La Guía (<i>diaphania sp</i>) Paratrioza (<i>Bactericera cockerelli</i>) Picudo Del Chile (<i>Anthonomus eugeniei</i>) Mosca Blanca (<i>Bemisia tabaci</i>) Pulgón (<i>Aphididae gossypii</i>) Piojo Harinoso (<i>planococcus Sp.</i>) Trips (<i>Frankliniella Sp.</i>) Minador De La Hoja (<i>Liriomyza sativae</i>)	8 a 15 ML/litro de agua
Aguacatero Papaya Mango cítricos	Mosca Blanca (<i>Bemisia Sp</i>) Pulgón (<i>Aphididae Sp.</i>) Piojo Harinoso (<i>Planococcus sp.</i>) Trips (<i>Frankliniella sp.</i>) Barrenillo Del Aguacate (<i>Conotrachelus sp.</i>) Araña Roja (<i>Paratetranychus sp</i>) Escamas (<i>Icerya Purchasi, Pseudococcus sp</i>)	8 a 15 ML/litro de agua
Fresa Arándano Frambuesa	Mosca Blanca (<i>Bemisia sp</i>) Pulgón (<i>Aphididae sp.</i>) Piojo Harinoso (<i>Planococcus sp.</i>) Trips (<i>Frankliniella sp.</i>) Chicharritas (<i>Empoasca sp</i>) Gusano Del Fruto (<i>Helicoverpa sp</i>) Araña Roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	8 a 15 ML/litro de agua
Ajo Cebolla Cebollín esparrago	Trips (<i>Thrips tabaci</i>)	8 a 15 ML/litro de agua
Cítricos	Psílido Asiático De Los Cítricos (<i>Diaphorina sp</i>) Escama (<i>Icerya Purchasi</i>)(<i>Pseudococcus sp</i>)	8 a 15 ML/litro de agua